

Patientkort:

Indikation for Vreya:

Vreya anvendes til behandling af hudlidelser som akne, meget fedtet hud og øget hårvækst hos kvinder i den fødedygtige alder. På grund af lægemidlets svangerskabsforebyggende egenskaber bør det kun ordineres til dig, hvis din læge finder, at behandling med et hormonelt svangerskabsforebyggende lægemiddel er hensigtsmæssig.

Du bør kun tage Vreya, hvis din hudlidelse ikke er blevet bedre efter anvendelse af andre behandlinger mod akne, herunder lokal behandling af huden og antibiotika.

VIGTIG INFORMATION OM VREYA OG RISIKOEN FOR BLODPROPPER

Alle østrogen-progestagen kombinationspræparater såsom Vreya øger den sjældne, men vigtige risiko for at få en blodprop. Den samlede risiko for at få en blodprop er lille, men blodpropper kan være alvorlige, og de kan i meget sjældne tilfælde endda være dødelige.

Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke tegn og symptomer, du skal lægge mærke til, og hvad du skal gøre, hvis du har en større risiko for at få en blodprop.

I hvilke situationer er risikoen for en blodprop størst?

- i løbet af det første år du bruger Vreya (herunder hvis du begynder at bruge det igen efter en pause på 1 måned eller længere)
- hvis du er meget overvægtig (body mass index (BMI) over 30 kg/m²)
- hvis du er over 35 år
- hvis du har et nært familiemedlem, som har haft en blodprop i en relativt ung alder (f.eks. under 50 år)
- hvis du har født inden for de sidste par uger

Hvis du ryger og er over 35 år anbefales det på det kraftigste, at du holder op med at ryge eller, at du får en non-hormonel behandling mod akne og/eller hirsutisme.

Søg straks lægehjælp, hvis du oplever nogle af de følgende symptomer:

- Svære smerter eller hævelse i et af dine ben der kan være ledsaget af ømhed, varme eller ændring af hudfarve til f.eks. bleg, rødlig eller blålig hud. Det kan være, at du har en **dyb venetrombose**.
- Pludselig, uforklarlig åndenød eller hurtig vejrtrækning; stærke smerter i brystet, som kan forværres under dybe vejrtrækninger; pludselig hoste uden en åbenlys årsag (hvor der kan hostes blod op). Du kan have en alvorlig komplikation ved dyb venetrombose, som kaldes en **lungeemboli**. Dette opstår, hvis blodproppen flytter sig fra benet til lungen.
- Bryst smerter, ofte akutte, men nogle gange kun ubehag, trykkende og tyngende fornemmelse, ubehag i den øvre del af kroppen, der stråler ud i ryggen, kæben, halsen, armen samtidig med en mæthedsfølelse forbundet med fordøjelsesbesvær eller kvælningfornemmelser, svedtendens, kvalme, opkastning eller svimmelhed. Du kan have et **hjerteanfald**.
- Svaghed eller følelseløshed i ansigt, arm eller ben, især i den ene side af kroppen, besvær med at tale eller forstå; pludselig forvirring; pludselig synstab eller sløret syn; svær hovedpine/migræne, der er værre end normalt. Du kan have et **slagtilfælde**.

Vær opmærksom på symptomer på en blodprop, især hvis du:

- Lige har gennemgået en operation
- Har været sengeliggende i lang tid (f.eks. på grund af en skade eller sygdom, eller hvis du har benet i gips)
- Har været på en lang rejse (f.eks. en langdistanceflyvning)

Husk at fortælle lægen, sundhedspersonalet eller kirurgen, at du tager Vreya, hvis du:

- Skal opereres eller er blevet opereret
- Bliver spurgt af sundhedspersonalet om du tager nogle lægemidler

Læs den medfølgende indlægsseddel eller gå ind på www.indlaegsseddel.dk for yderligere oplysninger.

Hvis du har mistanke om, at du har bivirkninger i forbindelse med anvendelse af Vreya, er det vigtigt, at du taler med din læge. Du kan også melde bivirkningen direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.